

AVERTISSEMENTS AGRICOLES

BULLETIN
TECHNIQUE
DES
STATIONS
D'AVERTISSEMENTS
AGRICOLES

DIP - 6-6-73 538767

PUBLICATION PÉRIODIQUE

ÉDITION DE LA STATION "CENTRE" (Tél. 87-18-28 - 87-18-29)

(CHER, INDRE, LOIRET, LOIR-ET-CHER, INDRE-ET-LOIRE, EURE-ET-LOIR)

Sous-Régie de la Protection des Végétaux, 93, rue de Curambourg - 45400 FLEURY-LES-AUBRAIS

C.C.P. : La Source 4.604-25

ABONNEMENT ANNUEL

30 Francs

Supplément n° 1 au Bulletin n° 153

5 Juin 1973

- 19 -

VIGNES

MILDIOU DE LA VIGNE

Des taches primaires sont apparues dans la plupart des vignobles. D'autre part, les pluies souvent très abondantes de la fin de la semaine dernière ont lessivé le premier traitement conseillé dans notre Bulletin du 28 Mai. Enfin la végétation de la vigne est active.

Il est donc conseillé d'effectuer un deuxième traitement qui devra être terminé, au plus tard, le 8 Juin. Nous rappelons que le concours pour la détection des foyers primaires de Mildiou est toujours ouvert et nous demandons à tous les viticulteurs de nous envoyer les taches qu'ils observeraient dans leurs vignes.

BLACK-ROT DE LA VIGNE

Le traitement dirigé contre le Mildiou de la vigne sera également efficace contre cette maladie.

Nous rappelons que les traitements contre le Black-Rot sont obligatoires dans les communes du département du Cher, de l'Indre, de l'Indre et Loire, du Loir et Cher déclarées contaminées.

VERS DE LA GRAPPE

Les premières éclosions des jeunes chenilles ont été observées. D'autres éclosions sont à prévoir dans les prochains jours. Les infestations étant très variables suivant les régions, et même les vignobles, il est impossible de conseiller un traitement généralisé.

Dans toutes les vignes régulièrement infestées les années précédentes, il est conseillé d'effectuer un traitement qui devra être terminé, au plus tard, au début de la semaine prochaine. Dans les autres vignes, l'observation des premières attaques permettra de déterminer l'opportunité d'un traitement. Ces attaques sont caractérisées par la présence de "glomérules" constitués par les jeunes chenilles qui rassemblent les boutons floraux au moyen de fils soyeux.

OIDIUM - ARAIGNEE ROUGE - PYRALE

Les indications données dans nos Bulletins précédents restent toujours valables.

DEGATS DE GRELE

Des orages de grêle se sont abattus sur certains vignobles, notamment dans la région de MENETOU-SALON et de SANCERRE. Les soins à donner après une attaque de grêle peuvent se résumer ainsi :

1°) - lorsqu'il reste un peu de récolte, laisser les rameaux portant des grappes, mais tailler court tous les autres s'ils sont fortement abîmés.

2°) - quand la récolte est entièrement perdue, il est préférable de tout retailler immédiatement. Cette opération n'est valable que jusqu'à la fin du mois de Juin. Plus tard, il est préférable de s'abstenir.

3°) - la taille doit s'effectuer dans le noeud.

Par la suite les traitements dirigés contre le Mildiou devront être très suivis, la nouvelle végétation devant apparaître au moment où la maladie est en général très dangereuse.

ARBRES FRUITIERS

TAVELURES DU POMMIER ET DU POIRIER

Les projections d'ascospores ne sont pas encore terminées. D'autre part des taches de plus en plus nombreuses apparaissent dans les vergers insuffisamment protégés. De plus de nouvelles sorties de taches sont à prévoir à partir du 15 Juin ; ces taches seront consécutives aux pluies très abondantes du 1er Juin. Il est donc conseillé d'assurer une protection parfaite des arbres et de renouveler le traitement dès que celui-ci aura perdu son efficacité par suite du lessivage par les pluies ou du développement de la végétation.

OIDIUM DU POMMIER

Les manifestations de cette maladie sont nombreuses dans certains vergers. Il y a donc lieu de profiter du traitement dirigé contre la Tavelure pour continuer la lutte contre l'Oïdium.

MOUCHE DE LA CERISE - CYLINDROSPORIOSE DU CERISIER

Les indications données dans notre Bulletin du 18 Mai restent toujours valables.

CARPOCAPSE

Les sorties de papillons se poursuivent. Mais il est encore trop tôt pour intervenir. Il est conseillé d'attendre le prochain bulletin.

MALADIE DU DESSECHEMENT DU FRAMBOISIER

Un nouveau traitement est conseillé contre cette maladie.

POMMES DE TERRE

MILDIOU DE LA POMME DE TERRE

Les premières manifestations de la maladie ont été observées dans des circonscriptions voisines. Les pluies de la deuxième quinzaine du mois de Mai et du 1er Juin ont pu provoquer des contaminations dont les manifestations risquent de passer inaperçues.

En conséquence, un premier traitement est conseillé sur toutes les cultures non destinées à un prochain arrachage avec l'un des produits mentionnés dans la liste qui a été remise à chaque abonné.

Nous rappelons que le concours pour la détection des foyers primaires de Mildiou est ouvert et nous demandons aux agriculteurs de nous envoyer les taches qu'ils pourraient observer dans les cultures.

Les Ingénieurs chargés des
Avertissements Agricoles

G. RIBAUT
B. PACQUETEAU
B. LELIEVRE

L'Ingénieur en Chef d'Agronomie
Chef de la Circonscription phytosanitaire "CENTRE"

G. BENAS